

Polyter®

Horticulture et Paysagisme

Paysagisme Programme Foncier

Résultats de Plantations et Fleurissement – Jardins d’Orient Saint Martin (Caraïbes)

Dans le cadre du programme immobilier de création d’un village de vacances, Polyter a été utilisé sur l’ensemble des applications en plantation, végétalisation et fleurissement. A Saint-Martin, les différentes essences végétales sont adaptées à certaines conditions d’humidité et de température, ce qui provoque une répartition étagée des plantes en fonction de l’altitude. De plus, les côtes exposées à l’action permanente des vents Alizés, à l’est, sont généralement plus sèches et colonisées par des végétaux présentant des adaptations particulières. La forêt littorale se situe en haut de plage. Elle est constituée d’arbres plus grands comme les Résiniers de bord de mer, les Mancenilliers toxiques, les Amandiers et les Tamariniers. C’est aussi là que se rencontrent les Cocotiers, originaires d’Asie du sud-est et introduits au début du XVII^{ème} siècle.



Vu sur la Baie Orientale

L’île de Saint Martin
Face aux villas, préparation des zones de plantations



Entrée du village Jardin d’Orient



Polyter®

Horticulture et Paysagisme

Paysagisme Programme Foncier

Résultats de Plantations et Fleurissement – Jardins d'Orient Saint Martin (Caraïbes)

Au sommet d'un morne, surplombant le site privilégié de la Baie Orientale, avec une vue extraordinaire sur l'île de Tintamarre et sur la mer Atlantique, se trouve le village d'Orient Bay. Sur la côte au vent, dans la région de Baie Orientale, et jusqu'à 100 mètres d'altitude se développe la forêt sèche. Les arbustes épineux comme les Acacias et les Suretiers en font parfois un fourré impénétrable. C'est aussi dans cette zone que se rencontrent les nombreux cactus comme les Têtes-à-l'Anglais, reconnaissables à leur chapeau rouge, les Raquettes à piquants et les Cactus cierges. Des champs déboisés depuis l'époque coloniale sont semés en Herbe de Guinée, destinée à l'alimentation du bétail et il n'est pas rare d'y rencontrer des Cotonniers, Tamariniers, Manguiers et Indigotiers, vestiges des anciens champs cultivés. Au delà de 100 mètres d'altitude, dans les régions qui ont été peu défrichées, se développe la forêt moyenne. C'est le domaine des grands arbres où l'humidité ambiante permet le développement d'une végétation luxuriante. Parmi les plus courants, citons le Gommier, le Latanier, les Palmistes, le Ricin et le Gaïac. Sur les arbres se développent des plantes parasites épiphytes et diverses lianes, alors qu'à leur pied poussent différentes sortes de fougères.



En bordure de terrain très pentu, plantation avec Polyter dans les endroits les plus délicats à revitaliser

Application de Polyter au fond du trou de plantation en fonction du volume



Mise en œuvre sur les talus des plantes cultivées en pépinière



Polyter[®]

Horticulture et Paysagisme

Paysagisme Programme Foncier

Résultats de Plantations et Fleurissement – Saint Martin



*L'ensemble
du programme
de plantations
a été effectué
autour des
villas avant le
fleurissement
final avec
Polyter*



Polyter[®]

Horticulture et Paysagisme

Paysagisme Programme Foncier

Résultats de Plantations et Fleurissement – Saint Martin



*Résultats du programme
de végétalisation, plantation
et fleurissement du village
Jardins de la baie orientale*

